## **IMPFKALENDER**

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2014. www.stiko.de

## ROBERT KOCH INSTITUT



Sprache: **Deutsch** 

	(in Wochen)	Säuglinge		(in Monaten)	Kleinkinder		Kinder		(in Jahren)	Jugendliche		Erwachsene		Nächste	Impftermine
ALTER	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	ab <b>18</b>	ab <b>60</b>		
IMPFUNG	U4				U6	U7	U7A/8	U9	U10	Jī					
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	Ň	A	2	(alle 10 Jal	A <b>f</b> are, ggf. <b>N</b> )		
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	.N·	A2			A <b>f</b> are, ggf. <b>N</b> )		
<b>Keuchhusten</b> Pertussis		G1 G2		G3	G4	Ň	∴ N				A <b>(f</b>				
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2 @	G3	G4	N				А	1	gg	N		
Hepatitis B		G1 G2 a G3 G4 N													
<b>Hib</b> Haemophilus influenzae Түр b		G1 G2 a G3 G4 N N									4				
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	Ņ.							SC		
Rotaviren	G1 <b>b</b>	G1 <b>b</b> G2 (G3)													Y _ '
<b>Meningokokken</b> Serogruppe C					<b>G</b> (ab 12 M		Ň								
Masern					G1	G2	N					S d			
Mumps Röteln					G1	G2	N .								
<b>Windpocken</b> Varizellen					G1	G2	N							₽R	Gefördert durch:
Grippe Influenza													<b>S</b> (jährlich)		Bundesministerium für Gesundheit
HPV Humane Papillomviren										G1 G2 e e	N e				aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

## **ERLÄUTERUNGEN**



NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

Früherkennungsuntersuchung

Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen
- Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 13 bzw. 9 14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff), Anzahl der Impfstoffdosen siehe Fachinformation!
- (†) Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.